

表 1 不同组织部位 NPY 基因表达水平比较

Table 1 Relative NPY mRNA levels in different tissues

组织 Tissue	数量 No.	平均数±标准差 Average± St.D	组织 Tissue	数量 No.	平均数±标准差 Average±St.D
下丘脑 Hypothalamus	4	442.38±72.23 <sup>A</sup>	胰腺 Pancreas	4	0.15±0.06 <sup>C</sup>
垂体 Pituitary	4	274.19±19.6 <sup>B</sup>	小肠 Intestine	4	176.86±47.09 <sup>B</sup>
心脏 Heart	4	10.86±0.89 <sup>C</sup>	卵巢 Ovary	4	68.43±8.16 <sup>C</sup>
肝脏 Liver	4	0.04±0.02 <sup>C</sup>	子宫 Uterus	4	0.11±0.08 <sup>C</sup>
脾脏 Spleen	4	8.64±0.49 <sup>C</sup>	胸肌 Pectoral muscle	4	0.09±0.05 <sup>C</sup>
肾脏 Kidney	4	6.11±0.86 <sup>C</sup>	腿肌 Leg muscle	4	0.19±0.13 <sup>C</sup>

注: 上标相同字母表示差异不显著(  $p > 0.05$  ), 不同大写字母表示差异极显著(  $p < 0.01$  )

Note: Means within a row with no common superscript differ significantly at  $p > 0.05$ ; different captical letter ( $p < 0.01$ )