

表 1 供试菌株的寄主范围测定结果

Table 1 The host range determination results of test strains

接种植物 Inoculated plant	分类地位 Taxonomic statue	发病情况 Pathogenicity
锥栗 <i>Castanea henryi</i> (Skan) Rehd. et Wils.	壳斗科 Fagaceae	+
狗尾草 <i>Setaria viridis</i> (Linn.) Beauv.	禾本科 Gramineae	-+
漆树 <i>Rhus verniciflua stokes</i>	漆树科 Anacardiaceae	+
马蹄莲 <i>Zantedeschia aethiopica</i> (L.) Spreng.	天南星科 Araceae	-
万年青 <i>Rohdea japonica</i> (Thunb.) Roth	百合科 Liliaceae	-+
山核桃 <i>Carya cathayensis</i> Sarg.	胡桃科 Juglandaceae	+
木瓜 <i>Chaenomeles sinensis</i> (Thouin) Koehne	蔷薇科 Rosaceae	-
柑橘 <i>Citrus reticulata</i> Blanco	芸香科 Rutaceae	-+
富贵竹 <i>Dracaena sandieriana</i>	龙舌兰科 Agavaceae	-

注：“+”：发病；“-”：不发病；“-+”：侵染但不表现症状

Note: "+": Having pathogenicity; "-": No pathogenicity; "-+": Infection but no disease signs