

表 2 不同酿造高粱品种在浙江地区栽培农艺性状差异

Table 2 Agronomic traits of different brewing sorghum varieties in Zhejiang

| 品种 | 晋杂 22 | 晋杂 102 | 汾酒梁 1 号 | 晋糯 4 号 | 526626 | 晋 0742 | 晋糯 202 | 晋中 0592 | 晋糯 3 号 |
|-----------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 生育日数(天) | 97 | 100 | 105 | 108 | 100 | 102 | 109 | 100 | 107 |
| 株高(cm) | 166.10±7.5 | 160.80±9.93 | 135.40±6.73 | 148.13±4.37 | 105.00±2.65 | 134.38±4.23 | 158.00±8.45 | 111.75±6.55 | 158.40±5.86 |
| 主穗长度(cm) | 39.46±0.5 | 35.88±2.23 | 38.80±2.41 | 33.88±2.06 | 34.40±0.17 | 39.98±3.06 | 44.13±2.36 | 34.53±1.98 | 43.80±1.30 |
| 主穗柄长度(cm) | 37.98±2.82 | 36.40±2.76 | 43.56±4.9 | 36.90±2.92 | 35.53±0.5 | 39.55±4.54 | 36.85±3.17 | 39.38±2.14 | 34.60±3 |
| 主穗柄直径(cm) | 1.62±0.14 | 1.50±0.2 | 1.49±0.09 | 1.51±0.1 | 1.28±0.1 | 1.70±0.16 | 1.64±0.17 | 1.30±0.15 | 1.62±0.15 |
| 单穗粒重(g) | 114.40±11.06 | 100.02±30.09 | 143.04±16.47 | 133.30±8.3 | 81.13±3.84 | 144.39±18.59 | 146.09±32.94 | 72.06±7.12 | 163.10±13.75 |
| 千粒重(g) | 26.57±0.55 | 31.70±0.7 | 28.57±0.31 | 29.27±0.35 | 26.20±0.69 | 29.77±0.49 | 23.33±0.51 | 21.13±0.12 | 33.23±0.75 |