

表 3 喂食麻风树仁粉的尖齿胡鲶鱼苗尸体最初和最终的分析

Table 3 Initial and Final Carcass Analysis of *Clarias gariepinus* fingerlings fed *Jatropha curcas* kernel meal

参数 Parameter	尸体成份 Carcass composition						P 值 P-Value
	初始 Initial	食物 I Diet I	食物 II Diet II	食物 III Diet III	食物 IV Diet IV	食物 V Diet V	
湿度 Moisture	72.04 ±0.06	73.29 ±0.29 <sup>b</sup>	73.05 ±0.055 <sup>c</sup>	73.05 ±0.04 <sup>c</sup>	75.16 ±0.155 <sup>a</sup>	70.06 ±0.06 <sup>d</sup>	0.01
蛋白质 Protein	8.44 ±0.02	11.08 ±0.01 <sup>d</sup>	11.09 ±0.04 <sup>d</sup>	13.15 ±0.06 <sup>a</sup>	11.16 ±0.05 <sup>c</sup>	11.46 ±0.06 <sup>b</sup>	0.01
灰 Ash	6.87 ±0.00	3.71 ±0.01 <sup>d</sup>	4.63 ±0.03 <sup>c</sup>	5.71 ±0.01 <sup>a</sup>	5.23 ±0.02 <sup>b</sup>	3.60 ±0.02 <sup>e</sup>	0.01
纤维 Fibre	2.00 ±0.00	2.01 ±0.01	1.97 ±0.03	2.00 ±0.001	2.00 ±0.02	2.06 ±0.06	0.446
脂肪 Fat	2.82 ±0.05	1.71 ±0.01 <sup>b</sup>	2.05 ±0.05 <sup>a</sup>	1.63 ±0.03 <sup>b</sup>	2.01 ±0.01 <sup>a</sup>	2.03 ±0.03 <sup>a</sup>	0.01
无氮浸出物 NFE	7.64 ±0.03	8.21 ±0.33 <sup>b</sup>	7.21 ±0.19 <sup>c</sup>	4.47 ±0.05 <sup>d</sup>	4.43 ±0.17 <sup>d</sup>	10.81 ±0.06 <sup>a</sup>	0.01